

종근당 글리아티린[®] 연질 캡슐

콜린알포세레이트

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 약과 함께 보관하십시오.

[제품 주요 정보]

1. 종근당글리아티린 연질캡슐은 뇌혈관 질환, 뇌대사 개선제입니다.
2. 이 약은 1회 1캡슐을 1일 2~3회 복용합니다.
3. 이 약은 제제의 특성상 온도변화에 민감하므로 항상 서늘한 곳에 보관하십시오.

[약리작용]

콜린신경 전달체계 정상화
 종근당글리아티린연질캡슐은 뇌의 중요한 신경전달물질 중의 하나인 acetylcholine의 전구체로서, 체내에서 대사되어 acetylcholine으로 작용합니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

유효성분 : 콜린알포세레이트(별규)400mg,
 기타첨가제 : 농글리세린, 산화티탄, 에시틀 및 소르비탄류, 에틸바닐린, 정제수, 젤라틴, 황색산화철

[성상]

무색투명의 점조한 액을 넣은 담황색을 띤 타원형의 연질캡슐제

[효능·효과]

- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력 감소- **감정 및 행동변화** : 정서불안, 자극과민성, 주위무관심- **노인성 가성우울증**

[용법·용량]

콜린알포세레이트로서 1회 400mg을 1일 2~3회 경구투여합니다. 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 **2. 이상반응** 1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여합니다. 2) 소

화기계 : 위염, 위질환 3) 정신신경계 : 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 경련, 운동과다

3. 보관 및 취급상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에 서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다. ※ 본 제품은 제제 특성상 온도변화에 민감합니다. 따라서 여름철의 창가 혹은 자동차 내부와 같은 30℃이상의 온도에서는 캡슐의 변형이 발생할 수 있으니, 항상 서늘한 장소에서 보관하십시오.

ckdpharm.com 참조

※ PTP포장 상태로 보관 및 조제하시고, 복용할 때 개봉하십시오.

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

※ 이 첨부문서 작성일자(2018. 08. 17) 이후 변경된 내용은 종근당 홈페이지 (www.ckdpharm.com) 및 소비자상담 전화번호 (080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.

[포장단위] 15캡슐, 90캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
이 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다. KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 적격업소 제품 ®=등록상표

[제조사]

(주)서흥 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61(연제리 683)

[제조의뢰자]



종근당



소비자 중심 경영
공정거래위원회 | 한국소비자원

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로 3가) 공장 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담) 제품상세정보 : www.