

타크로벨주5mg/타크로벨서방캡슐 3용량/타크로벨캡슐 4용량/타크로벨정 4용량	
사용상의 주의사항	
1. 경고 5) 다른 면역억제제를 복용한 환자와 마찬가지로, 타크로리무스를 투여 받은 환자도 림프종과 기타 다른 악성 종양, 특히 피부에서 암의 발생 가능성이 증가 되었다. <중략> 면역계의 과다억제로 말미암은 감염에 대한 감수성의 증가 위험성 때문에 이 약은 다른 면역억제제와의 병용시에는 주의하여 사용하도록 한다. 4. 이상반응 1) 중대한 이상반응 (9) 림프종 등의 악성종양 : 때때로 Epstein-Barr 바이러스와 관련된 림프종식성 질환 또는 림프종(초기 증상 : 발열, 림프절종대 등) 이 나타날 수 있으므로 <생략>	1. 경고 5) 다른 면역억제제를 복용한 환자와 마찬가지로, 타크로리무스를 투여 받은 환자도 림프종과 기타 다른 악성 종양, 특히 피부에서 암의 발생과 카포시육종의 가능성이 증가 되었다. <중략> 면역계의 과다억제로 말미암은 감염에 대한 감수성의 증가 위험성 때문에 이 약은 다른 면역억제제와의 병용시에는 주의하여 사용하도록 한다. 이 약을 투여받은 환자에서 공격적인 질환 형태와 치명적인 결과를 보이는 사례를 포함한 카포시육종이 보고되었다. 일부 사례에서는 면역억제 강도를 낮춘 후 카포시육종이 호전되는 것으로 관찰되었다. 4. 이상반응 1) 중대한 이상반응 (9) 악성종양 : 때때로 Epstein-Barr 바이러스와 관련된 림프종식성 질환 또는 림프종(초기 증상 : 발열, 림프절종대 등), 피부 악성 종양 및 카포시육종이 나타날 수 있으므로 <생략>